arXiv:1405.5854v1 [cs.SC] 22 May 2014

Universidad de La Habana
Facultad de Matemática y Computación

Diferenciación Automática Anidada. Un enfoque algebraico.

Trabajo presentado como parte de los requisitos para optar por el título de Licenciado en Matemática

Autor:
Juan Luis Valerdi Cabrera

Tutor:
Msc. Fernando Raul Rodriguez Flores

Junio de 2012

Resumen

En este trabajo se presenta una propuesta para realizar Diferenciación Automática Anidada utilizando cualquier biblioteca de Diferenciación Automática que permita sobrecarga de operadores. Para calcular las derivadas anidadas en una misma evaluación de la función, la cual se asume que sea analítica, se trabaja con el modo forward utilizando una nueva estructura llamada SuperAdouble, que garantiza que se aplique correctamente la diferenciación automática y se calculen el valor y la derivada que se requiera. También se presenta un enfoque algebraico de la Diferenciación Automática y en particular del espacio de los SuperAdoubles.

Índice general

Introducción **3**

1. Preliminares **6**
1.1. Derivadas anidadas 6
1.2. Estructuras algebraicas 7

2. Diferenciación Automática **10**
2.1. Introducción a la AD 10
2.1.1. Modo forward 11
2.2. Implementación 14

3. Cálculo de Derivadas Anidadas **17**
3.1. La clase SuperAdouble 18
3.2. Relación entre Adoubles y Superadoubles. 18
3.3. Modificación del código de la función anidada 20

4. Espacio Adouble **22**
4.1. Definición de $\mathbb{A}$. Operaciones elementales 23
4.2. Funciones de variable adouble 25
4.2.1. Unidad dual 26
4.2.2. Definición de funciones 28

5. Espacio SuperAdouble **30**
5.1. Preliminares y caso base 30
5.2. Introducción a $\mathbb{SA}$ 32
5.3. Funciones de variable superadouble 38

Conclusiones **44**

Bibliografía **45**

Anexos **47**

Introducción

Muchas veces es necesario calcular el valor numérico de una función y a la vez obtener una aproximación precisa de las derivadas. Ejemplos de esto se pueden encontrar en los métodos numéricos de la programación no lineal [1], en los métodos implícitos para la resolución numérica de ecuaciones diferenciales [2] y en problemas inversos en la asimilación de datos [3].

La Diferenciación Automática (AD, por sus siglas en inglés) es una herramienta que puede usarse para calcular las derivadas de cualquier función diferenciable, de forma automática. En este contexto "automática" significa que el usuario solo necesita escribir el código fuente de la función en un lenguaje determinado, y la herramienta puede calcular las derivadas solicitadas sin incurrir en errores de truncamiento [3].

Existen herramientas de diferenciación automática para varios lenguajes de programación, como ADOL-C [4] para programas escritos en C y C++, ADIFOR [5] para programas escritos en Fortran, y ADOLNET [6] para lenguajes de la plataforma .NET.

Una forma de crear estas herramientas de AD en lenguajes que soporten sobrecarga de operadores es crear una clase llamada Adouble que contenga dos campos de tipo double, uno llamado valor y otro derivada. Para esta clase se sobrecargan los operadores aritméticos y las funciones elementales, para que, al mismo tiempo que se calculen los resultados de las operaciones, se calculen el valor de las derivadas de esas operaciones [3].

Sin embargo, existen ocasiones en las que es necesario calcular unas derivadas como paso intermedio para el cálculo de otras y con las técnicas usuales de AD esto no es posible. Un ejemplo sencillo donde se aprecia este fenómeno es el siguiente.

Ejemplo 1. *Sea f la función definida como*

$$f(x) = x^2 + \dot{g}(x^3),$$

donde $\dot{g}$ es la función derivada de $g(x) = e^{x^2}$. Suponiendo que sólo se conoce el código fuente de g y de f, se desea calcular el valor y la derivada de f en el punto $x = x_0$.

Estas derivadas que intervienen en el cálculo de otras reciben el nombre de derivadas anidadas, y aunque existen herramientas de Diferenciación Automática como ADOL-C [7] que permiten el cálculo de estas derivadas, no existe un método general que funcione en todas las herramientas existentes [8], por lo que puede decirse que no existe una solución general para este problema.

En este trabajo se propone una metodología y una herramienta computacional para calcular derivadas anidadas de funciones analíticas utilizando cualquier biblioteca de AD que soporte sobrecarga de operadores.

La metodología propuesta en este trabajo parte de la creación de un nuevo tipo de dato que se llamará SuperAdouble. Al igual que el tipo de dato Adouble, contendrá dos campos, uno para almacenar el valor y otro para almacenar la derivada. A diferencia de los Adoubles, en el que los campos valor y derivada son de tipo double, en los Superadoubles, estos campos serán de tipo Adouble. Para esta nueva clase también se sobrecargan los operadores aritméticos y las funciones elementales para calcular simultáneamente el valor de las operaciones y sus derivadas. Al realizar operaciones con estos SuperAdoubles es posible calcular derivadas anidadas. El objetivo fundamental de este trabajo es demostrar esta afirmación.

Para demostrar que al realizar las operaciones con SuperAdoubles se obtienen los valores y las derivadas deseadas se realiza una presentación algebraica del espacio de los números Adoubles (que son el fundamento de la Diferenciación Automática) y de los números SuperAdoubles (que son el fundamento de este trabajo).

Este documento está estructurado de la siguiente forma: en el Capítulo 1 se presentan conceptos básicos de la diferenciación automática y del álgebra que se usarán en este trabajo; en el Capítulo 2 se presentan los elementos básicos de la AD, sus modos e implementaciones; en el Capítulo 3 se introduce una metodología para utilizar AD cuando haya que calcular derivadas

anidadas; el Capítulo 4 se dedica a definir y explicar la estructura algebraica que sustenta la AD, y en el Capítulo 5 se define $\mathbb{SA}$, una estructura algebraica que ayuda a demostrar que los números superadoubles pueden utilizarse para calcular derivadas anidadas.

Capítulo 1

Preliminares

En este capítulo se presentan las definiciones y propiedades necesarias para el desarrollo de este trabajo como derivadas anidadas, estructuras algebraicas y elementos de lenguajes de programación. En la Sección 1.1 se presentan las definiciones relacionadas con las derivadas anidadas y en la Sección 1.2, las estructuras algebraicas que se usarán en los Capítulos 4 y 5.

1.1. Derivadas anidadas

En esta sección se definen algunos conceptos relacionado con la diferenciación anidada como variable original, variable anidada, función anidada, derivada original, derivada anidada y derivada compuesta.

Definición 1.1. *Sea $f(x) = \dot{g}(h(x))$ una función real donde g y h son funciones conocidas. Se les llamará a las diferentes partes de f de la siguiente forma:*

- *A x se le llamará variable original.*
- *A $y = h(x)$ se le llamará variable anidada.*
- *A $g(x)$ se le llamará función anidada.*
- *A $g'(x) = \frac{dg(h(x))}{dx}$ se le llamará derivada original.*
- *A $\dot{g}(x) = \frac{dg(h(x))}{dh}$ se le llamará derivada anidada.*
- *A $\dot{g}'(x) = \frac{d\dot{g}(h(x))}{dx} = \frac{d^2g(h(x))}{dxdh}$ se le llamará derivada compuesta.*

En el caso de que $h(x) = x$ los conceptos de derivada original y derivada anidada coinciden, lo cual implica que la derivada compuesta sea $\frac{d^2g(x)}{dx^2}$.

Ejemplo 2. *La función del Ejemplo 1 es*

$$f(x) = x^2 + \dot{g}(x^3),$$

con $g(x) = e^{x^2}$. *En este caso se tiene lo siguiente:*

- *La variable* x *es la variable original.*
- $y = x^3$ *es la variable anidada.*
- *La función* $g(x) = e^{x^2}$ *es la función anidada.*
- *La derivada original es* $g'(x) = 6x^5e^{x^6}$.
- *La derivada anidada es* $\dot{g}(x) = 2x^3e^{x^6}$.
- *La derivada compuesta es* $\dot{g}'(x) = 6x^2e^{x^6}(1 + 2x^6)$.

1.2. Estructuras algebraicas

En esta sección se presentan las definiciones y resultados del álgebra abstracta que se utilizarán en los Capítulos 4 y 5. Este contenido se puede encontrar en [11] y [12].

Definición 1.2. *Un conjunto* G *provisto de una ley interna* $+$, *es un grupo si* $\forall a, b \in G$ *se cumple las siguiente propiedades:*

1. *La suma es asociativa:* $(a + b) + c = a + (b + c)$
2. *Existe un elemento neutro:* $\exists e \in G : a + e = e + a = a$
3. *Cada elemento posee opuesto:* $\exists a' \in G : a + a' = a' + a = e$

Al elemento e de la definición anterior se le llama neutro o cero del grupo. En el caso de que la operación $+$ sea conmutativa, se dice que el grupo es abeliano.

Definición 1.3. *Un conjunto* A *provisto de una adición* $+$ *y de una multiplicación* $\cdot$ *(el símbolo del operador se puede omitir) que sean internas posee una estructura de anillo si* $\forall a, b, c \in A$ *se cumple:*

1. *A posee una estructura de grupo abeliano para la adición*

2. *El producto es asociativo:* $(ab)c = a(bc)$

3. *El producto distribuye respecto a la suma a la izquierda:* $a(b + c) = ab + ac$

4. *El producto distribuye respecto a la suma a la derecha:* $(b+c)a = ba+ca$

Si la multiplicación posee un elemento neutro e se dice que el anillo es unitario. Siendo A un anillo unitario, si dado $a \in A$ existe un a' tal que $aa' = a'a = e$, se dice que a es inversible en A.

Si la multiplicación en un anillo A es conmutativa se dice que A es un anillo conmutativo.

Definición 1.4. *Se llama subanillo de un anillo A a un subconjunto no vacío B de A con las operaciones de A internas en B que hacen de B un anillo.*

Teorema 1.1. *Para que un subcojunto no vacío B de un anillo A sea un subanillo de A es necesario y suficiente que para todo $a \in A$ y $b \in B$, entonces*

$$a - b \in B \wedge ab \in B.$$

Demostración. Véase en [11]. □

Teorema 1.2. *En un anillo conmutativo se cumple*

$$(a_1 + a_2 + \ldots + a_m)^n = \sum \frac{n!}{p_1!p_2!\ldots p_m!} a_1^{p_1} \ldots (a_m)^{p_m}, \qquad (1.1)$$

donde la suma del segundo miembro se extiende a todas las combinaciones de $p_1, p_2, \ldots, p_m$ de enteros no negativos tales que

$$\sum_{i=1}^{m} p_i = n.$$

Demostración. Véase en [11]. □

Definición 1.5. *Un conjunto K provisto de una adición y de una multiplicación posee una estructura de cuerpo para esas dos operaciones si:*

1. *K posee una estructura de anillo para esas dos operaciones.*

2. *$L^* = K - \{0\}$ (donde 0 es el elemento neutro de la adición) posee una estructura de grupo para la multiplicación.*

Si la multiplicación en un cuerpo K es conmutativa se dice que K es un cuerpo conmutativo.

Definición 1.6. *Dado un cuerpo conmutativo K, de elementos neutros 0 y 1 con respecto a la suma y la multiplicación, se dice que un conjunto E provisto de una operación interna y de una operación externa cuyo dominio de operadores es K, tiene una estructura de espacio vectorial sobre K si $\forall \lambda, \mu \in K$ y $\forall x, y \in E$ se cumple:*

1. *E es un grupo abeliano para sus operación interna*

2. *La operación externa cumple: $\lambda(\mu x) = (\lambda\mu)x$*

3. *La operación externa cumple: $1x = x$*

4. *La operación externa es distributiva con relación a la suma en K : $(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$*

5. *La operación externa es distributiva con relación a la operación interna de E : $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$*

Definición 1.7. *Un conjunto A provisto de una estructura vectorial sobre un cuerpo K y de una estructura de anillo se dice que posee una estructura de álgebra sobre K si $\forall \alpha, \beta \in K$ y $\forall x, y \in A$ se cumple*

$$(\alpha x)(\beta y) = (\alpha\beta)(xy).$$

Estos conceptos y resultados se usarán en los Capítulos 4 y 5 para la representación algebraica de la AD.

Capítulo 2

Diferenciación Automática

En este capítulo se realiza una introducción a la diferenciación automática, en la que se presentarán sus modos de aplicación, ejemplos y vías de implementación. Para la implementación se presentarán códigos en el lenguaje de programación C# con el objetivo de mostrar la aplicación de la AD en los ejemplos que se presentan en este capítulo.

2.1. Introducción a la AD

La diferenciación automática, también conocida como diferenciación algorítmica, es un conjunto de técnicas y herramientas que permiten evaluar numéricamente la derivada de una función definida mediante su código fuente en un lenguaje de programación.

La AD está basada en el hecho de que para evaluar una función en un lenguaje de programación dado se ejecutan una secuencia de operaciones aritméticas (adición, sustracción, multiplicación y división) y llamados a funciones elementales (exp, log, sen, cos, etc.). Aplicando la regla de la cadena al mismo tiempo que se realizan estas operaciones, se pueden calcular derivadas de cualquier orden tan exactas como la aritmética de la máquina lo permita [3].

La base de la AD es la descomposición de diferenciales que provee la regla de la cadena. Para una composición de funciones $f(x) = g(h(x))$ se obtiene, a partir de la regla de la cadena,

$$\frac{df}{dx} = \frac{dg}{dh}\frac{dh}{dx}.$$

Existen dos modos para aplicar la AD, el modo hacia adelante o modo forward y el modo hacia atrás o modo reverse. El modo forward se obtiene al aplicar la regla de la cadena de derecha a izquierda, es decir, primero se calcula dh/dx y después dg/dh, mientras que el modo reverse se obtiene cuando se aplica la regla de la cadena de izquierda a derecha [3].

A continuación se presentan las ideas fundamentales del modo hacia adelante, que por ser más sencillo e intuitivo, permite explicar con mayor claridad el funcionamiento de la diferenciación automática. El lector interesado en el modo hacia atrás puede consultar [3].

2.1.1. Modo forward

Los siguientes ejemplos ilustran el funcionamiento del modo forward:

Ejemplo 3. *Se desea calcular el valor y la derivada de*

$$f(x) = x^2 \cdot \cos(x)$$

en el punto $x = \pi$.

La siguiente tabla contiene las operaciones necesarias para evaluar esta función en una computadora.

w_1	$=$	x	$=$	π
w_2	$=$	w_1^2	$=$	π^2
w_3	$=$	$\cos(w_1)$	$=$	-1
w_4	$=$	$w_2 w_3$	$=$	$-\pi^2$
y	$=$	w_4	$=$	$-\pi^2$

Para aplicar el modo hacia adelante, se almacena en una nueva variable la derivada de cada operación con respecto a la variable x. Esta derivada se puede calcular al mismo tiempo que se realiza la operación. La siguiente tabla ilustra este procedimiento.

w_1	$=$	x	$=$	π	$\dot{w}_1$	$=$	$\dot{x}$	$=$	1
w_2	$=$	w_1^2	$=$	π^2	$\dot{w}_2$	$=$	$2w_1\dot{w}_1$	$=$	2π
w_3	$=$	$\cos(w_1)$	$=$	-1	$\dot{w}_3$	$=$	$\sin(w_1)\dot{w}_1$	$=$	0
w_4	$=$	$w_2 w_3$	$=$	$-\pi^2$	$\dot{w}_4$	$=$	$w_2\dot{w}_3 + \dot{w}_2 w_3$	$=$	-2π
y	$=$	w_4	$=$	$-\pi^2$	$\dot{y}$	$=$	$\dot{w}_4$	$=$	-2π

En la tabla anterior, las variables $\dot{w}_i$ almacenan la derivada con respecto a x de la operación w_i. Como se desea calcular la derivada con respecto a la variable x, entonces la nueva variable $\dot{w}_1 = \frac{dw_1}{dx}$ se inicializa con el valor 1. Al finalizar el cálculo, en la variable $\dot{w}_4$ se tiene el valor de la derivada de $f(x)$ con respecto a x.

El siguiente ejemplo muestra cómo se puede aplicar el modo hacia adelante para calcular derivadas parciales de funciones de más de una variable.

Ejemplo 4. *Se desea calcular el valor y el gradiente de*

$$f(x_1, x_2) = x_1 x_2 + \text{sen}(x_1)$$

en $x_1 = \pi$ *y* $x_2 = 2$.

La función f de este ejemplo puede expresarse mediante las siguientes operaciones.

w_1	$=$	x_1	$=$	π
w_2	$=$	x_2	$=$	2
w_3	$=$	$w_1 w_2$	$=$	2π
w_4	$=$	$\text{sen}(w_1)$	$=$	0
w_5	$=$	$w_3 + w_4$	$=$	2π
y	$=$	w_5	$=$	2π

Para calcular el gradiente utilizando el modo forward hay que realizar el mismo procedimiento del ejemplo anterior, pero en este caso dos veces: una por cada derivada parcial. A continuación se muestra el cálculo de la derivada parcial $\frac{df}{dx_1}$.

w_1	$=$	x_1	$=$	π	$\dot{w}_1$	$=$	$\dot{x}_1$	$=$	1
w_2	$=$	x_2	$=$	2	$\dot{w}_2$	$=$	$\dot{x}_2$	$=$	0
w_3	$=$	$w_1 w_2$	$=$	2π	$\dot{w}_3$	$=$	$\dot{w}_1 w_2 + w_1 \dot{w}_2$	$=$	2
w_4	$=$	$\text{sen}(w_1)$	$=$	0	$\dot{w}_4$	$=$	$\cos(w_1)\dot{w}_1$	$=$	-1
w_5	$=$	$w_3 + w_4$	$=$	2π	$\dot{w}_5$	$=$	$\dot{w}_3 + \dot{w}_4$	$=$	1
y	$=$	w_5	$=$	2π	$\dot{y}$	$=$	$\dot{w}_5$	$=$	1

En este caso, la variable $\dot{w}_2$ se inicializa con valor 0 porque $\frac{\partial x_2}{\partial x_1} = 0, w_2 = x_2$ y $\dot{w}_2 = \frac{\partial w_2}{\partial x_1}$. Al finalizar los cálculos, en la variable $\dot{w}_5$ se tiene el valor de la derivada $\frac{\partial f(x)}{\partial x_1}$.

El procedimiento presentado en los ejemplos anteriores se puede generalizar de la siguiente forma.

Sea $f : R^n \to R^m$ una función diferenciable. Se denotarán las n variables reales de entrada como

$$w_{i-n} = x_i \qquad \text{y} \qquad \dot{w}_{i-n} = \dot{x}_i, \quad \text{con } i = 1 \ldots n \quad \text{y} \quad \dot{x}_i = 1.$$

Las variables $\dot{x}_i$ se inicializan con el valor de las derivadas parciales de cada variable x_i con respecto a la variable original. Si se desea calcular la derivada parcial de f respecto a x_i, entonces $\dot{x}_i$ debería ser 1 y $\dot{x}_j$ debería ser 0 para toda j diferente de i.

Como f está compuesta por funciones elementales, es conveniente denotarlas de alguna forma. A la j-ésima función elemental se le denotará por ϕ_j.

Para descomponer a f en operaciones elementales se denotarán nuevas variables w_i y $\dot{w}_i$ como

$$w_i = \phi_i(w_j) \qquad \text{con } j \prec i, \tag{2.1}$$

$$\dot{w}_i = \sum_{j \prec i} \frac{\partial}{\partial w_j} \phi_i(w_j) \dot{w}_j,$$

donde en este caso $i = 1 \ldots l$ y l es el número de operaciones elementales que componen a f. La simbología $\phi_i(w_j)$ con $j \prec i$ significa que ϕ_i depende directamente de w_j, es decir, que para evaluar ϕ_i se usa explícitamente w_j. También es usual denotar (2.1) como

$$w_i = \phi_i(w_j)_{j \prec i}.$$

Con las notaciones anteriores se puede expresar el procedimiento general de la siguiente forma:

$w_i = x_i$	$i = 1 \dots n$
$\dot{w}_{i-n} = \dot{x}_i$	
$w_i = \phi_i(w_j)_{j \prec i}$	$i = 1 \dots l$
$\dot{w}_i = \sum_{j \prec i} \frac{\partial}{\partial w_j} \phi_i(w_j) \dot{w}_j$	
$y_{m-i} = w_{l-i}$	$i = m-1 \dots 0$
$\dot{y}_{m-i} = \dot{w}_{l-i}$	

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el procedimiento general del modo forward está estructurado en tres fases: primero se inicializan las variables, después se ejecutan las operaciones y se calculan las derivadas, y finalmente se devuelven los valores y la derivada calculada.

En esta sección se ha presentado la AD desde un punto de vista teórico. En la siguiente sección se muestra una posible vía para implementar estas ideas computacionalmente.

2.2. Implementación

Existen dos estrategias para lograr AD: transformación del código fuente y sobrecarga de operadores [3].

Para utilizar la metodología propuesta en este trabajo resulta más conveniente utilizar la sobrecarga de operadores, por lo que en esta sección se presentan sus elementos fundamentales. El lector interesado en la transformación de código puede consultar [9].

Para implementar la AD utilizando sobrecarga de operadores se debe crear una nueva clase, la cual se llamará en este trabajo Adouble siguiendo la notación de [3].

En esta clase se deben definir dos campos de números reales, uno, que usualmente recibe el nombre de valor, para almacenar el resultado de la

operación que este Adouble representa, y otro, que usualmente recibe el nombre de derivada, para almacenar la derivada de esa operación. Estos campos valor y derivada son la representación computacional de las variables w_i y $\dot{w}_i$.

Una vez definida esta nueva clase, se sobrecargan los operadores aritméticos y las funciones elementales, para que, al mismo tiempo que se calculan los resultados de las operaciones, también se pueda calcular el valor de las derivadas.

La siguiente tabla muestra los valores de los campos valor y derivada de cada uno de los adoubles que intervienen en la evaluación de la función $f(x) = x^2 \cdot cos(x)$. Nótese que cuando se realizan todas las operaciones, en el campo derivada del adouble y se obtiene el valor de la derivada de la función en el punto en que fue evaluada.

Adouble w_1	w_1.valor $= \pi$	w_1.derivada $= 1$
Adouble $w_2 = w_1^2$	w_2.valor $= \pi^2$	w_2.derivada $= 2\pi$
Adouble $w_3 = \cos(w_1)$	w_3.valor $= -1$	w_3.derivada $= 0$
Adouble $w_4 = w_2 * w_3$	w_4.valor $= -\pi^2$	w_4.derivada $= -2\pi$
Adouble $y = w_4$	y.valor $= -\pi^2$	y.derivada $= -2\pi$

Esta vía tiene la ventaja de que es fácil de implementar y que para utilizarlo solo hay que modificar ligeramente el código fuente de la función que se desea derivar [9].

En la Figura 2.1 se muestra la implementación de un programa en C# que calcula el valor de $f(x) = x^2 \cdot \cos(x)$ en $x = 2$; y en la Figura 2.2 las modificaciones necesarias para calcular la derivada en ese punto.

Esta idea se puede modificar fácilmente para calcular derivadas parciales de funciones de más de una variable. El lector interesado en este tema puede consultar [3] y [4].

En este capítulo se han presentado las ideas fundamentales de la AD en las que se sustenta la solución propuesta en el capítulo siguiente para el cálculo de derivadas anidadas utilizando diferenciación automática.

```
class Example
{
  static void Main()
  {
    double x = 2; //Inicialización de x
                  //para evaluar f en 2
    double y = x*x + cos(x); //Cálculo de f
    Console.WriteLine("El valor de f en x = 2 es: " + y);
  }
}
```

Figura 2.1: Código de $f(x) = x^2 \cdot \cos(x)$

```
class Example
{
  static void Main()
  {
    Adouble x = new Adouble(); \\Inicialización de x como
                               \\Adouble
    x.valor = 2; \\ Se quiere el valor y la derivada
                 \\ en x = 2
    x.derivada = 1; \\La derivada de x con respecto a x es 1
    Adouble y = x*x + cos(x);
    Console.WriteLine("El valor de f en x = 2 es: " + w4.valor);
    Console.WriteLine("La derivada de f en x = 2 es: " + w4.derivada);
  }
}
```

Figura 2.2: Código modificado de $f(x) = x^2 \cdot \cos(x)$

Capítulo 3

Cálculo de Derivadas Anidadas

En este capítulo se presenta una metodología para calcular derivadas anidadas utilizando cualquier biblioteca de Diferenciación Automática mediante sobrecarga de operadores. Esta metodología se presenta para funciones de una variable real con el objetivo de facilitar su exposición, pero su extensión a funciones de varias variables es posible de la misma forma que las técnicas de diferenciación automática se extienden a funciones varias variables.

La metodología que se propone es la siguiente:

1. Partir de una biblioteca de Diferenciación Automática en la que exista un tipo de dato Adouble.

2. Definir un nuevo tipo de dato llamado SuperAdouble. Esta nueva estructura tendrá dos campos: valor y derivada, y ambos campos serán del tipo de dato Adouble definido en la biblioteca del paso 1. El hecho de que estos campos sean de tipo Adouble permitirá calcular las derivadas anidadas.

3. Definir funciones para construir superadoubles a partir de adoubles y para obtener los campos valor y derivada de variable de tipo SuperAdouble. Estas funciones se presentan en la Sección 3.2.

4. Modificar el código fuente de la función anidada para calcular las derivadas anidadas.

En las siguientes secciones se detallan cada uno estos pasos.

3.1. La clase SuperAdouble

El segundo paso propone crear una nueva clase llamada SuperAdouble. Este nuevo tipo de dato tiene un campo valor y un campo derivada, ambos de tipo Adouble. Al igual que la clase Adouble, los operadores aritméticos y las funciones elementales se sobrecargan para que cuando operen con valores de este tipo permitan calcular los valores y las derivadas anidadas que se deseen.

El campo valor de los SuperAdouble es de tipo Adouble, por lo que este contiene a un campo valor y un campo derivada, ambos de tipo double. Es decir, para una variable de tipo SuperAdouble tiene sentido hablar de los campos valor.valor y valor.derivada. Por el mismo motivo, en una variable de tipo superadouble existen los campos derivada.valor y derivada.derivada.

Estos cuatro campos: valor.valor, valor.derivada, derivada.valor y derivada. derivada se relacionan con las derivadas anidadas a través del siguiente resultado, que es el principal aporte de este trabajo.

Teorema 3.1. *En un objeto de tipo SuperAdouble se cumple que:*

- *valor.valor es el valor de la función anidada.*
- *valor.derivada es la derivada original.*
- *derivada.valor contiene la derivada anidada.*
- *derivada.derivada contiene la derivada compuesta.*

Demostración. El objetivo del Capítulo 5 es demostrar este teorema. □

Una vez que esté definida esta nueva clase, es necesario definir funciones para crear instancias de esta clase y obtener las derivadas y valores deseados. Estas funciones se muestran en la siguiente sección.

3.2. Relación entre Adoubles y Superadoubles.

Para calcular derivadas anidadas son necesarias tres funciones que relacionen variables de tipo Adouble y variables de tipo SuperAdouble. Estas

funciones son *push*, *popV* y *popD*. A continuación se presentan cada una de ellas y su relación con el cálculo de derivadas anidadas.

La función *push* recibe como parámetro una variable x de tipo Adouble y devuelve una variable X de tipo SuperAdouble. El campo valor de la variable X sería el Adouble x, y el campo derivada sería un Adouble con valor 1 y derivada 0.

Ejemplo 5. *Si se tiene un Adouble* $x = (4, 10)$*, donde la primera componente del vector es el campo valor del Adouble, y la segunda, el campo derivada, entonces al aplicar push se obtiene un SuperAdouble* X *con los siguientes campos:*

- $X.valor.valor = 4.$
- $X.valor.derivada = 10.$
- $X.derivada.valor = 1.$
- $X.derivada.derivada = 0.$

Por otra parte, las funciones *popV* y *popD* reciben como argumento un SuperAdouble y devuelven un Adouble. La función *popV* devuelve el campo valor del SuperAdouble y *popD* devuelve su campo derivada.

Ejemplo 6. *Si se aplica la función popV al Superadouble* X *definido en el ejemplo anterior se obtiene un Adouble* x *con los siguientes campos:*

- $x.valor = 4.$
- $x.derivada = 10.$

Por otra parte, si se aplica la función popD al mismo SuperAdouble X *se obtiene:*

- $x.valor = 1.$
- $x.derivada = 0.$

Para calcular derivadas anidadas, estas funciones deben usarse para modificar el código fuente de la función anidada como se muestra en la siguiente sección.

3.3. Modificación del código de la función anidada

En esta sección se presentan las modificaciones que son necesarias realizar en el código fuente de la función anidada para utilizar los SuperAdouble, las funciones *push, popD* y *popV* y obtener los valores de las derivadas anidadas.

Siguiendo con el Ejemplo 1,

$$f(x) = x^2 + \dot{g}(x^3), \qquad g(x) = e^{x^2},$$

la Figura 3.1 muestra el código que permite calcular el valor de la función y su derivada en el punto $x = 3$ usando los SuperAdoubles y las funciones presentadas en la sección anterior.

```
class Example
{
  static void Main()
  {
    Adouble x = new Adouble();
    x.valor = 3;
    x.derivada = 1;
    Adouble w1 = x*x;             \\ w1 = x^2
    Adouble w2 = w1*x;            \\ w2 = x^3
    SuperAdouble Y1 = push(w2);   \\ crear el superadouble
    SuperAdouble Y2 = exp(Y1*Y1); \\ g(x) = exp(x^2)
    SuperAdouble W3 = exp(W2);
    Adouble w3 = popD(Y2);        \\ obtener la derivada anidada
    Adouble w4 = w1 + w3;         \\ w4 = x^2 + gdot(x^3)
    Console.WriteLine("El valor de f en x = 3 es: " +
                      w5.valor);
    Console.WriteLine("La derivada de f en x = 3 es: " +
                      w5.derivada);
  }
}
```

Figura 3.1: Aplicación de los SuperAdoubles en la AD.

En el código de la Figura 3.1 se empieza trabajando con números de tipo Adouble para calcular el valor y la derivada de las operaciones que no pertenezcan a la función anidada. La línea

```
SuperAdouble Y1 = push(w2);
```

crea un objeto SuperAdouble a partir de la variable anidada. Después de la creación de W1 se efectúan las operaciones de la función anidada utilizando Superadoubles. Con la línea

```
Adouble w3 = popD(Y2);
```

se obtiene un Adouble que en su campo valor tiene la derivada anidada, y en su campo derivada tiene la derivada compuesta. Finalmente, en la línea

```
Adouble w4 = w1 + w3;
```

se termina el cálculo de la funcion original.

Como todas las operaciones se han realizado con adoubles, en el campo derivada del Adouble w4 se tiene la derivada de la función original, que era el objetivo que se perseguía.

Este ejemplo ilustra que usando la metodología propuesta es posible calcular derivadas anidadas. En los próximos capítulos se fundamentan los resultados de esta sección desde una representación algebraica y se demuestra Teorema 3.1 que es el basamento matemático de la metodología.

Capítulo 4

Espacio Adouble

En este capítulo se presenta la diferenciación automática desde un punto de vista algebraico. Para representar la clase Adouble mediante una estructura algebraica se extienden los números reales agregándole una nueva componente y definiendo una aritmética que garantice que en la primera componente se obtengan los resultados de cada operación, y en la segunda, las derivadas de estas operaciones.

Esta presentación de la AD desde el álgebra no es nueva. La estructura algebraica que representa a los números adoubles se conoce en la literatura como números duales y tiene aplicaciones en la física y la mecánica [10].

En este capítulo se presentan las principales propiedades de estos números duales, que en este trabajo se les llamará números adoubles, o simplemente adoubles. Al conjunto de todos los adoubles se les llamará espacio Adouble.

El objetivo fundamental de presentar estas propiedades y sus demostraciones, es que sirven de base para, en el Capítulo 5, presentar el espacio SuperAdouble, sus propiedades fundamentales y demostrar que utilizándolas se pueden calcular derivadas anidadas.

La estructura de este capítulo es la siguiente: en la Sección 4.1 se definirá el espacio Adouble y se demostrará algunas de sus propiedades elementales; y en la Sección 4.2 se definen funciones de variable adouble y se demuestra que al evaluar una función analítica en un adouble, se obtiene un nuevo adouble que en su primera componente tiene el valor de la evaluación de la función, y en la segunda, el valor de la derivada de la función.

4.1. Definición de $\mathbb{A}$. Operaciones elementales

Observando cómo funciona la AD desde el punto de vista computacional, es posible definir una estructura algebraica que represente la clase Adouble. Esta se crea expandiendo el álgebra de los números reales con otra componente y definiendo una nueva aritmética que permita obtener, en la segunda componente las derivadas de las operaciones, como se muestra en la siguiente definición.

Definición 4.1. *El espacio Adouble* $\mathbb{A}$ *es el conjunto de los pares ordenados* $(x, \dot{x})$ *de números reales con la suma y multiplicación definidos por*

$$(a, \dot{a}) + (b, \dot{b}) = (a + b, \dot{a} + \dot{b}),$$

$$(a, \dot{a})(b, \dot{b}) = (ab, a\dot{b} + \dot{a}b).$$

A los elementos del espacio Adouble se les llamará números adoubles o simplemente adoubles.

En las operaciones de suma y multiplicación definidas en este espacio se aprecia que en la primera componente se tiene el cálculo usual sobre los reales y en la segunda componente se obtiene la aritmética de las derivadas.

A partir de estas dos operaciones es posible obtener la resta y la división así como funciones que al ser evaluadas en un adouble devuelvan otro adouble que en la primera componente tengan el resultado de evaluar la función y en la segunda componente la derivada de la función.

Para cumplir este objetivo se pudiera definir directamente estas operaciones, pero usando como base la suma y la multiplicación se puede recurrir a la teoría de álgebras para obtener estas definiciones. La siguiente proposición brinda información sobre estas operaciones.

Proposición 4.1. $\mathbb{A}$ *es un anillo conmutativo y unitario. El cero es (0,0) y la identidad multiplicativa es (1,0).*

Demostración. Se obtiene directamente a partir de la definición del espacio $\mathbb{A}$ □

El hecho de que $\mathbb{A}$ sea un anillo significa que todo elemento tiene un opuesto para la suma y en este caso el opuesto de $(a, \dot{a})$ es $(-a, -\dot{a})$

Proposición 4.2. *Cuando se restan dos adoubles, en la primera componente se obtiene el resultado de la resta, y en la segunda, su derivada.*

Demostración. La resta es una operación que se define como sumar con el opuesto, por lo que la resta de dos adoubles se define como:

$$(a, \dot{a}) - (b, \dot{b}) = (a - b, \dot{a} - \dot{b}),$$

lo cual es el resultado que se quería: la primera y segunda componente coinciden con la operación y derivada de la resta. □

La derivada del inverso es $\dot{a}/a^2$. Con la multiplicación definida sobre $\mathbb{A}$ se puede demostrar que en la segunda componente del inverso de un adouble se obtiene precisamente la derivada del inverso. La siguiente proposición demuestra esto.

Proposición 4.3. *El inverso de un adouble* $(a, \dot{a})$ *es* $(\frac{1}{a}, -\frac{\dot{a}}{a^2})$.

Demostración. Hallar el inverso de $(a, \dot{a})$ es equivalente a resolver la ecuación

$$(a, \dot{a})(x, \dot{x}) = (1, 0),$$

donde x y $\dot{x}$ son incógnitas. Esta ecuación es equivalente al sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} ax = 1 \\ a\dot{x} + \dot{a}x = 0 \end{cases}$$

que tiene solución

$$x = \frac{1}{a} \qquad \text{y} \qquad \dot{x} = -\frac{\dot{a}}{a^2}.$$

□

De la proposición anterior se deduce que en el caso de que $a = 0$, los adoubles no tienen inverso.

La división entre dos elementos de un anillo se realiza multiplicando uno por el inverso del otro. La siguiente proposición proporciona este resultado.

Proposición 4.4. *El resultado de dividir* $(a, \dot{a})$ *por* $(b, \dot{b})$ *es*

$$\Big(\frac{a}{b}, \frac{b\dot{a} - a\dot{b}}{b^2}\Big).$$

Demostración. Para dividir

$$(a, \dot{a})/(b, \dot{b}),$$

se calcula

$$(a, \dot{a})\Big(\frac{1}{b}, -\frac{\dot{b}}{b^2}\Big) = \Big(\frac{a}{b}, \frac{b\dot{a} - a\dot{b}}{b^2}\Big).$$

□

Al no tener sentido hallar el inverso para $b = 0$, tampoco lo tendrá la división cuando se quiera dividir por un adouble que tenga la primera componente igual a cero. Se puede notar que la primera componente de la división contiene el resultado del cociente y la segunda componente la regla de la derivada para la división.

Hasta el momento se han definido las operaciones suma, resta, multiplicación y división entre adoubles, y en todos los casos, en la segunda componente se obtiene la derivada de la operación. Para poder utilizar los números adoubles para realizar AD falta definir funciones sobre $\mathbb{A}$ con el objetivo de obtener la su evaluación y su derivada en la primera y segunda componente, respectivamente. En la siguiente sección se definen estas funciones de variable adouble.

4.2. Funciones de variable adouble

La definición de funciones se facilita si se introduce el cambio de notación que se realiza en los números duales [10]. Para poder utilizar esta nueva notación es necesario definir sobre este espacio una estructura de álgebra.

Para definir un álgebra sobre $\mathbb{A}$ conviene definir una estructura vectorial y después demostrar su compatibilidad con el anillo. La siguiente proposición permite que la definición de espacio vectorial resulte natural.

Proposición 4.5. *$\mathbb{A}$ contiene a $\mathbb{R}$ como estructura de anillo.*

Demostración. Tomando el conjunto de adoubles $R = \{(a, 0) \in \mathbb{A} : a \in \mathbb{R}\}$, se tiene que

$$(a_1, 0) - (a_2, 0) = (a_1 - a_2, 0) \in R,$$

$$(a_1, 0)(a_2, 0) = (a_1 a_2, 0) \in R,$$

por lo que R constituye un subanillo de $\mathbb{A}$, que es isomorfo a $\mathbb{R}$ si se toma la aplicación que a cada adouble $(a, 0)$ le hace corresponder el número real a. □

Una vez demostrado que $\mathbb{R}$ es un subanillo de $\mathbb{A}$ se puede definir un espacio vectorial sobre $\mathbb{A}$.

Proposición 4.6. *Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ y $(a, \dot{a}) \in \mathbb{A}$, si se define el producto exterior $\alpha(a, \dot{a})$ como*

$$\alpha(a, \dot{a}) = (\alpha, 0)(a, \dot{a}) = (\alpha a, \alpha \dot{a}),$$

se tiene que para este producto exterior y la suma definida en $\mathbb{A}$, este espacio es un espacio vectorial.

Demostración. Las operaciones de suma y producto externo coinciden con las usuales de $\mathbb{R}^2$ como espacio vectorial. □

Como se tiene sobre $\mathbb{A}$ una estructura de anillo y de espacio vectorial se puede llegar a la siguiente proposición.

Proposición 4.7. *$\mathbb{A}$ es un álgebra conmutativa y unitaria.*

Demostración. Para realizar su demostración sólo basta demostrar que

$$(\alpha \hat{x})(\beta \hat{y}) = (\alpha\beta)\hat{x}\hat{y},$$

lo cual se obtiene de manera directa realizando las operaciones. □

En la siguiente subsección se muestra un cambio de notación que resulta de utilidad para realizar cálculos de multiplicación entre los adoubles, lo cual facilita la definición de funciones y el cálculo del cociente entre adoubles.

4.2.1. Unidad dual

El hecho de que $\mathbb{A}$ sea un álgebra y que contenga a los reales permite hacer un cambio de notación. Si se denota $\epsilon = (0, 1)$, entonces si $\dot{a} \in \mathbb{R}$ se tiene que $(0, \dot{a}) = \epsilon \dot{a}$, por lo que cualquier elemento $(a, \dot{a}) \in \mathbb{A}$ se puede expresar como

$$(a, \dot{a}) = (a, 0) + (0, \dot{a}) = (a, 0) + \epsilon \dot{a}. \tag{4.1}$$

Como el conjunto $R = \{(a, 0) \in \mathbb{A} : a \in \mathbb{R}\}$ es isomorfo a $\mathbb{R}$, entonces se puede reescribir (4.1) como

$$(a, \dot{a}) = a + \epsilon\dot{a}.$$

Es usual llamar a ϵ unidad dual. La suma y la multiplicación de dos adoubles usando la unidad dual resulta

$$(a + \epsilon\dot{a}) + (b + \epsilon\dot{b}) = a + b + \epsilon a + \epsilon b,$$

$$(a + \epsilon\dot{a})(b + \epsilon\dot{b}) = ab + \epsilon a\dot{b} + \epsilon\dot{a}b + \epsilon^2\dot{a}\dot{b},$$

pero como $\mathbb{A}$ es un álgebra se puede sacar factor común ϵ y se obtiene

$$(a + \epsilon\dot{a}) + (b + \epsilon\dot{b}) = a + b + \epsilon(a + b),$$

$$(a + \epsilon\dot{a})(b + \epsilon\dot{b}) = ab + \epsilon(a\dot{b} + \dot{a}b) + \epsilon^2\dot{a}\dot{b}.$$

Para obtener el resultado final de la multiplicación es necesario saber cómo opera la multiplicación de ϵ consigo mismo. La siguiente proposición muestra este resultado.

Proposición 4.8. $\epsilon^n = 0, \forall n \geq 2$.

Demostración. Como $\epsilon^2 = (0, 1)(0, 1) = (0, 0) = 0$, entonces

$$\epsilon^n = 0, \forall n \geq 2$$

. □

Con esta proposición se obtiene que la multiplicación es

$$(a + \epsilon\dot{a})(b + \epsilon\dot{b}) = ab + \epsilon(a\dot{b} + \dot{a}b).$$

Como se puede notar en la suma y la multiplicación usando la unidad dual se obtiene en la primera componente el resultado de la operación y en la unidad dual la derivada de la operación.

4.2.2. Definición de funciones

En esta subsección se definen funciones sobre $\mathbb{A}$ a partir funciones reales. Estas funciones tienen la característica que en la primera componente del resultado de su evaluación se obtiene el valor de la función y en la segunda, la derivada. Además, estas funciones tendrán la propiedad de ser extensiones de las funciones reales, en el sentido de que si se evalúan en un real se obtiene un valor real. La siguiente proposición brinda una extensión de funciones reales con la propiedad que se desea.

Proposición 4.9. *Sea $f(x)$ una función real de variable real que puede ser representada a través de su serie de Taylor: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n x^n}{n!}$. Si $x = a + \epsilon\dot{a}$, entonces se cumple que:*

$$f(a + \epsilon\dot{a}) = f(a) + \epsilon\dot{a}f'(a).$$

Demostración. Como la fórmula del binomio

$$(x + \epsilon\dot{x})^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} x^{n-i}(\epsilon\dot{x})^i$$

se cumple para los anillos conmutativos (Teorema 1.2), entonces se tiene que:

$$(x + \epsilon\dot{x})^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} x^{n-i}(\epsilon\dot{x})^i.$$

Como $\epsilon^p = 0 \ \ \forall p > 1$ (Proposición 4.8), entonces

$$(a + \epsilon\dot{a})^n = a^n + \epsilon p a^{n-1}\dot{a}$$

y

$$f(a + \epsilon\dot{a}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n(a + \epsilon\dot{a})^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n a^n}{n!} + \epsilon\dot{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n a^{n-1}}{(n-1)!} = f(a) + \epsilon\dot{a}f'(a).$$

□

La función $f(a + \epsilon\dot{a}) = f(a) + \epsilon\dot{a}f'(a)$ es una extensión de los reales: si se toma $b = 0$ se obtiene que $f(a) = f(a)$. En otras palabras, si se restringe la función a los reales, se obtiene un real.

Por otra parte, una función f definida de esta manera cumple la propiedad que se desea: en la primera componente se obtiene la evaluación de f y en la segunda se tiene su derivada al aplicar la regla de la cadena.

De manera similar a como se definió para el caso de una variable, una función de n variables adoubles se define como

$$f(x_1, \ldots, x_n) = f(a_1, \ldots, a_n) + \epsilon(\dot{a}_1 f'_{x_1}(a_1, \ldots, a_n) + \cdots + \dot{a}_n f'_{x_n}(a_1, \ldots, a_n)),$$

donde $x_i = a_i + \epsilon\dot{a}_i$ y $f'_{x_i}(a_1, \ldots, a_n)$ es la derivada parcial de f con respecto a la variable x_i, evaluada en $(a_1, \ldots, a_n)$. Al igual que en el caso de una variable, si $\dot{a}_i = 1$ y $\dot{a}_j = 0\ \forall j \neq i$, entonces

$$f(x_1, \ldots, x_n) = f(a_1, \ldots, a_n) + \epsilon f'_{x_i}(a_1, \ldots, a_n),$$

y en la segunda componente se obtiene la derivada parcial de f respecto a x_i.

En este capítulo se ha realizado una representación algebraica de los números adoubles, que son el fundamento de la diferenciación automática. Utilizando resultados del álgebra se demostró que utilizando números adoubles se pueden obtener las derivadas de cualquier función análitica. En el siguiente capítulo se presentan los números superadoubles desde una perspectiva algebraica, y se demuestra que es posible calcular derivadas anidadas utilizando la metodología propuesta en el Capítulo 3.

Capítulo 5

Espacio SuperAdouble

En este capítulo se demuestra el Teorema 3.1, que permite utilizar los números superadoubles para calcular derivadas anidadas. La demostración se realiza por inducción en las operaciones involucradas en el cálculo de la función anidada.

Al igual que en el Capítulo 4, se demuestra que el espacio formado por los números superadoubles es un anillo, un espacio vectorial y un álgebra; y se definen funciones de variable superadouble. En todos los casos se demuestra que con las operaciones definidas se obtienen las derivadas anidadas.

La estructura de este capítulo es la siguiente: en la Sección 5.1 se presenta el caso base de la inducción que permitirá demostrar el Teorema 3.1; en la Sección 5.2 se definirán representaciones algebraicas de la clase SuperAdouble y se demostrará el Teorema 3.1 para las operaciones elementales. Por último, en la Sección 5.3 se definirán funciones de variable SuperAdouble con las que se pueden calcular derivadas anidadas.

5.1. Preliminares y caso base

En esta sección se presenta la demostración que para un caso base se cumple que los SuperAdouble definidos en el Capítulo 3 permiten calcular derivadas anidadas.

La clase SuperAdouble tiene dos campos: valor y derivada, y cada uno de estos campos tienen a su vez dos campos, uno valor y uno derivada. Por lo tanto, una variable de tipo SuperAdouble tiene cuatro campos: valor.valor,

valor. derivada, derivada.valor, derivada.derivada, por lo que se pueden respresentar como pares ordenados de adoubles o como elementos de R^4.

El hecho de utilizar los SuperAdouble para evaluar y derivar funciones del tipo $f(x) = \dot{g}(h(x))$ implica que existe una función anidada, por lo que en ese contexto también existe una derivada original, una derivada anidada y una derivada compuesta. La correspondencia existente entre estas derivadas y los campos de las variables de tipo SuperAdouble es la siguiente, de acuerdo con el Teorema 3.1: el campo valor.valor de un superadouble es el valor de la función anidada; el campo valor.derivada, es la derivada original; el campo derivada.valor es la derivada anidada, y en el campo derivada.derivada se obtiene la derivada compuesta.

La demostración que en estos campos se obtienen estas derivadas se hará por inducción. Como caso base se tomará un superadouble X que sea el resultado de una operación *push*, pues esta es la primera operación que se hace con un SuperAdouble.

En el teorema siguiente se demuestra que para una variable X que sea el resultado de una operación *push* se cumple el teorema 3.1. Sin embargo, no tiene sentido hablar de derivada anidada y derivada compuesta si no existe una función anidada, y este es precisamente el caso de un superadouble que sea el resultado de un *push*. Para que tenga sentido hablar de derivada anidada y derivada compuesta en el superadouble $X = push(x)$, en el teorema se considerará que la función anidada $g(x)$ es la función identidad.

Teorema 5.1. *Sea $f(x) = \dot{g}(h(x))$ una función donde se conocen $h(x)$ y $g(y) = y$. Si (a, a') es el par de números reales que representan el valor y la derivada de $\mathbf{a} = h(x_0)$, entonces al aplicar $X = push((a, a')) = ((a, a'), (1, 0))$, y $Y = g(X)$, se obtiene que:*

- *$Y.valor.valor$ es $g(h(x_0))$.*
- *$Y.valor.derivada$ es $g'(h(x_0))$.*
- *$Y.derivada.valor$ es $\dot{g}(h(x_0))$.*
- *$Y.derivada.derivada$ es $\dot{g}'(h(x_0))$.*

Demostración. Por las hipótesis se tiene que $h(x_0) = a$ y $h'(x_0) = a'$, por lo que $g(h(x_0)) = a$ y $g'(h(x_0)) = \frac{dg(h(x))}{dx} = h'(x_0) = a'$. De esta forma se tiene los dos primeros puntos de la tesis.

Como $\dot{g}(x) \equiv 1$, entonces $\dot{g}(h(x_0)) = 1$, por lo que se cumple el tercer punto y como la derivada de una constante es cero, entonces se cumple el último punto porque $\dot{g}'(x) \equiv 0$. □

Este caso base, se utilizará como hipótesis de inducción para demostrar que las operaciones elementales y las funciones sobre clase SuperAdouble calcula la derivada anidada y compuesta.

En la próxima sección se definen las operaciones elementales con sus respectivas demostraciones de que calculan las derivadas anidadas.

5.2. Introducción a $\mathbb{SA}$

En la sección anterior se demostró el Teorema 5.1. Utilizando este teorema como caso base, en esta sección se aplicará inducción en las operaciones elementales que se realizan en una función para demostrar el Teorema 3.1.

La siguiente definición se usará para realizar una representación algebraica de la clase SuperAdouble usando la notación introducida en la sección anterior.

Definición 5.1. *El espacio SuperAdouble* $\mathbb{SA}$ *es el conjunto de pares ordenados* $(\hat{x}, \hat{y})$ *donde* $\hat{x}$ *y* $\hat{y}$ *son adoubles y la suma y multiplicación se definen de la siguiente forma:*

$$(\hat{a}, \hat{b}) + (\hat{c}, \hat{d}) = (\hat{a} + \hat{c}, \hat{b} + \hat{d}),$$

$$(\hat{a}, \hat{b})(\hat{c}, \hat{d}) = (\hat{a}\hat{c}, \hat{a}\hat{d} + \hat{b}\hat{c}).$$

Estas operaciones definidas sobre $\mathbb{SA}$ se realizan multiplicando y sumando elementos del espacio $\mathbb{A}$, por ejemplo, la primera componente de la suma es $\hat{a} + \hat{c}$, por tanto, si

$$\hat{a} = (a, \dot{a}),$$

$$\hat{c} = (c, \dot{c}),$$

entonces la primera componente de la suma es el adouble

$$\hat{a} + \hat{c} = (a + c, \dot{a} + \dot{c}).$$

A los elementos del espacio SuperAdouble se les llamará números superadoubles o simplemente superadoubles.

Lo que se quiere probar es que los superadoubles calculan derivadas anidadas en su tercera y cuarta componente. Para esto resulta más conveniente considerar los superadoubles como elementos de $\mathbb{R}^4$, por lo que resultaría de mucha utilidad encontrar un isomorfismo entre $\mathbb{SA}$ y un subconjunto de $\mathbb{R}^4$. Para tener un isomorfismo con las operaciones definidas es necesario tener alguna estructura algebraica como la proposición siguiente.

Proposición 5.1. *$\mathbb{SA}$ es un anillo conmutativo y unitario. El neutro con respecto a la suma es el elemento $\mathbf{0} = ((0,0),(0,0))$ y el neutro respecto al producto es $\mathbf{1} = ((1,0),(0,0))$.*

Demostración. La demostración es inmediata a partir de la definición del espacio, el lector interesado puede leerla en los anexos. □

Si se tiene dos elementos de $\mathbb{SA}$ entonces con la proposición anterior la resta se obtiene sumando por el opuesto del segundo elemento:

$$(\hat{a},\hat{b}) - (\hat{c},\hat{d}) = (\hat{a},\hat{b}) + (-\hat{c},-\hat{d}) = (\hat{a}-\hat{c},\hat{b}-\hat{d}).$$

A continuación se presenta otra definición del espacio $\mathbb{SA}$ en el sentido de isomorfismo. Esta nueva definición es importante porque se realiza directamente sobre los reales y no sobre $\mathbb{A}$, por lo que facilita el trabajo de cálculo cuando se definan la división de superadoubles y las funciones de variable superadouble.

Definición 5.2. *El espacio SuperAdouble $\mathbb{SA}_{\mathbb{R}}$ es el conjunto de $\mathbb{R}^4$ con la suma y multiplicación definidos por*

$$\mathbf{x}+\mathbf{y} = (x+y, x'+y', \dot{x}+\dot{y}, \dot{x}'+\dot{y}'), \tag{5.1}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{xy} = (&xy,\\ &xy'+x'y,\\ &x\dot{y}+\dot{x}y,\\ &x\dot{y}'+x'\dot{y}+\dot{x}y'+\dot{x}'y),\end{aligned} \tag{5.2}$$

donde $\mathbf{x} = (x, x', \dot{x}, \dot{x}')$ y $\mathbf{y} = (y, y', \dot{y}, \dot{y}')$.

Proposición 5.2. *El espacio $\mathbb{SA}_{\mathbb{R}}$ es un anillo conmutativo.*

Demostración. La demostración se deduce directo de la definición de anillo, el lector interesado en la demostración puede referirse a los anexos. □

A pesar de que $\mathbb{SA}_{\mathbb{R}}$ es un anillo unitario, no se demostró en la proposición anterior ya que con la siguiente proposición se obtiene como consecuencia del isomorfismo. Además de esta propiedad, el isomorfismo entre $\mathbb{SA}$ y $\mathbb{SA}_{\mathbb{R}}$ brinda la posibilidad de usar cualquiera de estos dos para representar la clase SuperAdouble.

Proposición 5.3. *Sea* $\phi : \mathbb{SA} \longrightarrow \mathbb{SA}_{\mathbb{R}}$ *la aplicación*

$$\phi(((a, \dot{a}), (b, \dot{b}))) = (a, \dot{a}, b, \dot{b}).$$

Con esta aplicación se tiene que $\mathbb{SA}$ *es isomorfo a* $\mathbb{SA}_{\mathbb{R}}$.

Demostración. Sea

$$\hat{a} = (a, \dot{a}), \qquad \hat{b} = (b, \dot{b}), \qquad \hat{c} = (c, \dot{c}), \qquad \hat{d} = (d, \dot{d}).$$

Como la aplicación ϕ es una biyección, sólo falta demostrar

$$\phi((\hat{a}, \hat{b}) + (\hat{c}, \hat{d})) = \phi((\hat{a}, \hat{b})) + \phi((\hat{c}, \hat{d})),$$

$$\phi((\hat{a}, \hat{b})(\hat{c}, \hat{d})) = \phi((\hat{a}, \hat{b}))\phi((\hat{c}, \hat{d})).$$

Calculando

$$\begin{aligned} \phi((\hat{a}, \hat{b}) + (\hat{c}, \hat{d})) &= \phi(((a + c, \dot{a} + \dot{c}), (b + d, \dot{b} + \dot{d}))) \\ &= (a + c, \dot{a} + \dot{c}, b + d, \dot{b} + \dot{d}), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \phi((\hat{a}, \hat{b})) + \phi((\hat{c}, \hat{d})) &= (a, \dot{a}, b, \dot{b}) + (c, \dot{c}, d, \dot{d}) \\ &= (a + c, \dot{a} + \dot{c}, b + d, \dot{b} + \dot{d}), \end{aligned}$$

se obtiene que

$$\phi((\hat{a}, \hat{b}) + (\hat{c}, \hat{d})) = \phi((\hat{a}, \hat{b})) + \phi((\hat{c}, \hat{d})).$$

Con la multiplicación se opera análogo a la suma, pero primero se necesita realizar los cálculos

$$\hat{a}\hat{c} = (ac, a\dot{c} + \dot{a}c),$$

$$\hat{a}\hat{d} = (ad, a\dot{d} + \dot{a}d),$$

$$\hat{b}\hat{c} = (bc, b\dot{c} + \dot{b}c),$$

que intervienen en la siguiente operación

$$\hat{a}\hat{d} + \hat{b}\hat{c} = (ad + bc, a\dot{d} + \dot{a}d + b\dot{c} + \dot{b}c).$$

Usando la expresión anterior se calcula

$$\phi((\hat{a}, \hat{b})(\hat{c}, \hat{d})) = \phi((\hat{a}\hat{c}, \hat{a}\hat{d} + \hat{b}\hat{c})) = (ac, a\dot{c} + \dot{a}c, ad + bc, a\dot{d} + \dot{a}d + b\dot{c} + \dot{b}c).$$

Por otra parte

$$\begin{aligned}\phi((\hat{a}, \hat{b}))\phi((\hat{c}, \hat{d})) &= (a, \dot{a}, b, \dot{b})(c, \dot{c}, d, \dot{d}) \\ &= (ac, a\dot{c} + \dot{a}c, ad + bc, a\dot{d} + \dot{a}d + b\dot{c} + \dot{b}c).\end{aligned}$$

por lo que se obtiene

$$\phi((\hat{a}, \hat{b})(\hat{c}, \hat{d})) = \phi((\hat{a}, \hat{b}))\phi((\hat{c}, \hat{d})).$$

□

En lo que sigue se usará la notación $(a \dot{+} b), (a \dot{-} b)$ y $(\dot{ab})$ para representar la derivada anidada de la operación correspondiente.

El siguiente teorema demuestra que los superadoubles calculan derivadas anidadas en las tres operaciones definidas hasta el momento.

Teorema 5.2. *Sean $(a, a', \dot{a}, \dot{a}')$ y $(b, b', \dot{b}, \dot{b}')$ dos superadoubles cuyas componentes representan el valor, la derivada original, la derivada anidada y la derivada compuesta de sus respectivas operaciones. Entonces se cumple*

$$(a, a', \dot{a}, \dot{a}') + (b, b', \dot{b}, \dot{b}') = (a + b, (a + b)', (a \dot{+} b), ((a \dot{+} b))'),$$

$$(a, a', \dot{a}, \dot{a}') - (b, b', \dot{b}, \dot{b}')(a - b, (a - b)', (a \dot{-} b), ((a \dot{-} b))'),$$

$$(a, a', \dot{a}, \dot{a}')(b, b', \dot{b}, \dot{b}') = (ab, (ab)', (\dot{ab}), ((\dot{ab}))').$$

Demostración. Sumando y restando se obtiene

$$(a, a', \dot{a}, \dot{a}') + (b, b', \dot{b}, \dot{b}') = (a + b, a' + b', \dot{a} + \dot{b}, \dot{a}' + \dot{b}'),$$

$$(a, a', \dot{a}, \dot{a}') - (b, b', \dot{b}, \dot{b}') = (a - b, a' - b', \dot{a} - \dot{b}, \dot{a}' - \dot{b}').$$

Usando que la suma de la derivada es la derivada de la suma se obtiene

$$\begin{aligned}(a+b, a'+b', \dot{a}+\dot{b}, \dot{a}'+\dot{b}') &= (a+b, (a+b)', (a \dot{+} b), (\dot{a}+\dot{b})') \\ &= (a+b, (a+b)', (a \dot{+} b), ((a \dot{+} b))'),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(a-b, a'-b', \dot{a}-\dot{b}, \dot{a}'-\dot{b}') &= (a-b, (a-b)', (a \dot{-} b), (\dot{a}-\dot{b})') \\ &= (a-b, (a-b)', (a \dot{-} b), ((a \dot{-} b))'),\end{aligned}$$

Para demostrar el tercer resultado de la tesis se aplica la regla del producto para las derivadas,

$$\begin{aligned}(a, a', \dot{a}, \dot{a}')(b, b', \dot{b}, \dot{b}') &= (ab, a'b + ab', \dot{a}b + a\dot{b}, (a\dot{b}' + a'\dot{b}) + (\dot{a}'b + \dot{a}b')) \\ &= (ab, (ab)', (\dot{ab}), ((a\dot{b})' + \dot{a}b)') \\ &= (ab, (ab)', (\dot{ab}), (\dot{a}b + (a\dot{b})') \\ &= (ab, (ab)', (\dot{ab}), ((\dot{ab}))').\end{aligned}$$

□

La división entre dos elementos se calcula multiplicando uno por el inverso del otro, por lo tanto, para realizar la división primero se necesita el inverso.

Proposición 5.4. *El inverso de* $\mathbf{a} = (a, a', \dot{a}, \dot{a}')$ *es*

$$\mathbf{a}^{-1} = \Big(\frac{1}{a}, -\frac{a'}{a^2}, -\frac{\dot{a}}{a^2}, \frac{2a'\dot{a} - a\dot{a}'}{a^3}\Big).$$

Demostración. El inverso del superadouble $\mathbf{a}$ es $\mathbf{a}^{-1} = (x, x', \dot{x}, \dot{x}')$ tal que

$$(a, a', \dot{a}, \dot{a}')(x, x', \dot{x}, \dot{x}') = (1, 0, 0, 0).$$

Hallar $\mathbf{a}^{-1}$ es equivalente a resolver el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} ax = 1 \\ ax' + a'x = 0 \\ a\dot{x} + \dot{a}x = 0 \\ a\dot{x}' + a'\dot{x} + \dot{a}x' + \dot{a}'x = 0 \end{cases}$$

cuya solución es:

$$x = \frac{1}{a},$$
$$x' = -\frac{a'}{a^2},$$
$$\dot{x} = -\frac{\dot{a}}{a^2},$$
$$\dot{x}' = \frac{2a'\dot{a} - a\dot{a}'}{a^3}.$$

□

La solución anterior no tiene sentido para $a = 0$, esto significa que los elementos con primera componente igual a cero no son inversibles.

El siguiente teorema demuestra que el cálculo de la derivada anidada del inverso es posible.

Teorema 5.3. *Sea* $\mathbf{a} = (a, a', \dot{a}, \dot{a}')$ *un superadouble cuyas componentes son el valor, la derivada original, la derivada anidada y la derivada compuesta de la operación que él representa. Entonces se cumple que:*

$$\mathbf{a}^{-1} = \Big(\frac{1}{a}, \Big(\frac{1}{a}\Big)', \Big(\dot{\frac{1}{a}}\Big), \Big(\dot{\frac{1}{a}}\Big)'\Big).$$

Demostración. Utilizando la regla de la derivada para la inversa y el producto se obtiene

$$\begin{aligned}
\mathbf{a}^{-1} &= \Big(\frac{1}{a}, -\frac{a'}{a^2}, -\frac{\dot{a}}{a^2}, \frac{2a'\dot{a} - a\dot{a}'}{a^3}\Big) \\
&= \Big(\frac{1}{a}, \Big(\frac{1}{a}\Big)', \Big(\dot{\frac{1}{a}}\Big), \frac{2aa'\dot{a}}{a^4} - \frac{\dot{a}'}{a^2}\Big) \\
&= \Big(\frac{1}{a}, \Big(\frac{1}{a}\Big)', \Big(\dot{\frac{1}{a}}\Big), \Big(-\dot{a} \cdot \frac{1}{a^2}\Big)'\Big) \\
&= \Big(\frac{1}{a}, \Big(\frac{1}{a}\Big)', \Big(\dot{\frac{1}{a}}\Big), \Big(\dot{\frac{1}{a}}\Big)'\Big).
\end{aligned}$$

□

Corolario 5.1. *Sea* $(a, a', \dot{a}, \dot{a}')$ *y* $(b, b', \dot{b}, \dot{b}')$ *dos superadoubles cuyas componentes son el valor, la derivada original, la derivada anidada y la derivada compuesta de las operaciones que ellas representan. Entonces se cumple*

$$(a, a', \dot{a}, \dot{a}')/(b, b', \dot{b}, \dot{b}') = (a/b, (a/b)', (\dot{a/b}), (\dot{a/b})'),$$

Demostración. Como la división de dos elementos es la multiplicación de uno por el inverso del otro, entonces por el Teorema 5.3 y el Teorema 5.2 se cumple la tesis. □

Hasta este momento se ha demostrado que las operaciones elementales sobre $\mathbb{SA}$ permiten calcular derivadas anidadas. Para poder utilizar los superadoubles con cualquier función diferenciable, falta probar que estas propiedades también se cumplen cuando se evalúa una función analítica cualquiera. El objetivo de la próxima sección es precisamente la definición de funciones de variable superadouble.

5.3. Funciones de variable superadouble

Al igual que los adoubles, las definiciones de funciones se facilita si se introduce un cambio de notación en los superadoubles. Para esta nueva notación es necesario definir sobre este espacio una estructura de álgebra y para definir un álgebra sobre $\mathbb{SA}$ falta definir una estructura vectorial y después demostrar su compatibilidad con el anillo.

La siguiente proposición ayuda a que la definición de espacio vectorial resulte natural.

Proposición 5.5. *$\mathbb{SA}$ contiene a $\mathbb{A}$ y $\mathbb{R}$ como estructura de anillo.*

Demostración. Tomando $A = \{(a, a', 0, 0) \in \mathbb{SA} : a, a' \in \mathbb{R}\}$ y restando y multiplicando dos elementos cualesquiera de este conjunto se obtiene que

$$\begin{aligned}(a, a', 0, 0) - (b, b', 0, 0) &= (a - b, a' - b', 0, 0) \in A,\\ (a, a', 0, 0)(b, b', 0, 0) &= (ab, ab' + a'b, 0, 0) \in A,\end{aligned}$$

por tanto, A es un subanillo de $\mathbb{SA}$ que es isomorfo a $\mathbb{A}$.

Como $\mathbb{SA}$ contiene a $\mathbb{A}$, esto implica que $\mathbb{SA}$ también contiene a los reales por la Proposición 4.5. Este subanillo es el conjunto $\{(a, 0, 0, 0) \in \mathbb{SA} : a \in \mathbb{R}\}$. □

Proposición 5.6. *El espacio SuperAdouble en un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ con la suma* (5.1) *y el producto externo definido por*

$$\alpha(a, a', \dot{a}, \dot{a}') = (\alpha, 0, 0, 0)(a, a', \dot{a}, \dot{a}') = (\alpha a, \alpha a', \alpha \dot{a}, \alpha \dot{a}'). \tag{5.3}$$

Demostración. Las operaciones de suma y producto externo coinciden con las usuales sobre $\mathbb{R}^4$ como espacio vectorial. □

Proposición 5.7. $\mathbb{SA}$ *es un álgebra conmutativa y unitaria con las operaciones* (5.1), (5.2) *y* (5.3).

Demostración. Hay que demostrar que $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{SA}$ se cumple

$$(\alpha \mathbf{a})(\beta \mathbf{b}) = (\alpha\beta)\mathbf{ab}.$$

Sea $\mathbf{a} = (a, a', \dot{a}, \dot{a}')$ y $\mathbf{b} = (b, b', \dot{b}, \dot{b}')$, entonces se cumple

$$\begin{aligned}(\alpha \mathbf{a})(\beta \mathbf{b}) &= (\alpha\beta ab, \alpha\beta(ab' + a'b), \alpha\beta(a\dot{b} + b\dot{a}),\\ &\quad \alpha\beta(a\dot{b}' + a'\dot{b} + \dot{a}b' + \dot{a}'b))\\ &= (\alpha\beta)\mathbf{ab}.\end{aligned}$$

□

Después de esta proposición se está en condiciones de presentar una nueva notación con el propósito comentado anteriormente: facilitar la definición de funciones de variable superadouble.

Como

$$(a, a', \dot{a}, \dot{a}') = (a, 0, 0, 0) + (0, a', 0, 0) + (0, 0, \dot{a}, 0) + (0, 0, 0, \dot{a}'),$$

se puede denotar

$$\epsilon_1 = (0, 1, 0, 0),$$

$$\epsilon_2 = (0, 0, 1, 0),$$

$$\epsilon_3 = (0, 0, 0, 1),$$

y se podría reescribir los superadoubles como

$$(a, a', \dot{a}, \dot{a}') = a + \epsilon_1 a' + \epsilon_2 \dot{a} + \epsilon_3 \dot{a}'.$$

Como la definición de funciones se realizará a través de la serie de Taylor de las funciones reales, se encontrarán factores donde aparecen los productos $\epsilon_i \epsilon_j$. La siguiente proposición proporciona estos resultados.

Proposición 5.8. *Los productos de cada par de valores ϵ_i, ϵ_j son*

$$\epsilon_1\epsilon_1 = 0,$$

$$\epsilon_1\epsilon_2 = \epsilon_3,$$

$$\epsilon_1\epsilon_3 = 0,$$

$$\epsilon_2\epsilon_2 = 0,$$

$$\epsilon_2\epsilon_3 = 0,$$

$$\epsilon_3\epsilon_3 = 0.$$

Demostración. Estos resultados se obtienen de realizar los siguientes cálculos.

$$\begin{aligned}
\epsilon_1\epsilon_1 &= (0,1,0,0)(0,1,0,0) = 0,\\
\epsilon_1\epsilon_2 &= (0,1,0,0)(0,0,1,0) = \epsilon_3,\\
\epsilon_1\epsilon_3 &= (0,1,0,0)(0,0,0,1) = 0,\\
\epsilon_2\epsilon_2 &= (0,0,1,0)(0,0,1,0) = 0,\\
\epsilon_2\epsilon_3 &= (0,0,1,0)(0,0,0,1) = 0,\\
\epsilon_3\epsilon_3 &= (0,0,0,1)(0,0,0,1) = 0.
\end{aligned}$$

Solo es necesario hacer estos seis cálculos porque el álgebra es conmutativa. □

Estos productos se resumen en la siguiente tabla.

	ϵ_1	ϵ_2	ϵ_3
ϵ_1	0	ϵ_3	0
ϵ_2	ϵ_3	0	0
ϵ_3	0	0	0

Lo que se quiere en este punto es definir sobre $\mathbb{SA}$ funciones que permitan calcular derivadas anidadas y que sean compatible con $\mathbb{A}$ y $\mathbb{R}$, es decir, que al restringir una función de $\mathbb{SA}$ a alguno de estos dos espacios, se obtengan valores de estos espacios. Para definir estas funciones, al igual que con los adoubles, se partirá del desarrollo en serie de Taylor de las funciones reales analíticas.

Teorema 5.4. *Sea f una función real analítica, $y = h(x)$ la variable anidada y x la variable original. Entonces si $\mathbf{a} = a + \epsilon_1 a' + \epsilon_2 \dot{a} + \epsilon_3 \dot{a}'$, y $\mathbf{b} = f(\mathbf{a}) = b + \epsilon_1 b' + \epsilon_2 \dot{b} + \epsilon_3 \dot{b}'$, se tiene que*

1. *b es el valor de la función: $f(a)$,*
2. *b' es la derivada original: $\frac{df(a)}{dx}$,*
3. *$\dot{b}$ es la derivada anidada: $\frac{df(a)}{dy}$, y*
4. *$\dot{b}'$ es la derivada compuesta: $\frac{d^2 f(a)}{dxdy}$.*

Demostración. Como $\mathbb{SA}$ es un álgebra conmutativa, por el Teorema 1.2 se cumple

$$(a + \epsilon_1 a' + \epsilon_2 \dot{a} + \epsilon_3 \dot{a}')^n = \sum \frac{n!}{p_1! p_2! p_3! p_4!} a^{p_1} (\epsilon_1 a')^{p_2} (\epsilon_2 \dot{a})^{p_3} (\epsilon_3 \dot{a}')^{p_4}, \quad (5.4)$$

donde la suma del segundo miembro se extiende a todas las combinaciones de p_1, p_2, p_3 y p_4 de enteros no negativos tales que

$$\sum_{i=1}^{4} p_i = n.$$

En la suma (5.4) existen muchos factores que se anulan cuando se aplica la Proposición 5.8, por lo tanto, sólo se tratarán los cinco casos donde esto no ocurre.

Caso 1: Si $p_2 = p_3 = p_4 = 0$, entonces $p_1 = n$ y

$$\frac{n!}{p_1! p_2! p_3! p_4!} a^{p_1} (\epsilon_1 a')^{p_2} (\epsilon_2 \dot{a})^{p_3} (\epsilon_3 \dot{a}')^{p_4} = a^n.$$

Caso 2: Si $p_2 = 1$ y $p_3 = p_4 = 0$, entonces $p_1 = n - 1$ y

$$\frac{n!}{p_1! p_2! p_3! p_4!} a^{p_1} (\epsilon_1 a')^{p_2} (\epsilon_2 \dot{a})^{p_3} (\epsilon_3 \dot{a}')^{p_4} = \epsilon_1 n a^{n-1} a'.$$

Caso 3: Si $p_3 = 1$ y $p_2 = p_4 = 0$, entonces $p_1 = n - 1$ y

$$\frac{n!}{p_1! p_2! p_3! p_4!} a^{p_1} (\epsilon_1 a')^{p_2} (\epsilon_2 \dot{a})^{p_3} (\epsilon_3 \dot{a}')^{p_4} = \epsilon_2 n a^{n-1} \dot{a}.$$

Caso 4: Si $p_4 = 1$ y $p_2 = p_3 = 0$, entonces $p_1 = n - 1$ y

$$\frac{n!}{p_1!p_2!p_3!p_4!}a^{p_1}(\epsilon_1 a')^{p_2}(\epsilon_2 \dot{a})^{p_3}(\epsilon_3 \dot{a}')^{p_4} = \epsilon_3 n a^{n-1}\dot{a}'.$$

Caso 5: Si $p_2 = p_3 = 1$ y $p_4 = 0$, entonces $p_1 = n - 2$ y

$$\frac{n!}{p_1!p_2!p_3!p_4!}a^{p_1}(\epsilon_1 a')^{p_2}(\epsilon_2 \dot{a})^{p_3}(\epsilon_3 \dot{a}')^{p_4} = \epsilon_3 (n-1) n a^{n-2} a'\dot{a}.$$

Considerando los resultados obtenidos en los cinco casos a partir de (5.4) y usándolos en (5.5) se obtiene que

$$\begin{aligned} f((a, a', \dot{a}, \dot{a}')) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n(a + \epsilon_1 a' + \epsilon_2 \dot{a} + \epsilon_3 \dot{a}')^n}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n a^n}{n!} + \epsilon_1 a' \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n a^{n-1}}{(n-1)!} + \epsilon_2 \dot{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n a^{n-1}}{(n-1)!} \\ &\quad + \epsilon_3 \left(a'\dot{a} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{c_n a^{n-2}}{(n-2)!} + \dot{a}' \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n a^{n-1}}{(n-1)!} \right). \end{aligned}$$

Como

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n a^{n-1}}{(n-1)!} = \dot{f}(a),$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{c_n a^{n-2}}{(n-2)!} = \ddot{f}(a),$$

se concluye que si $\mathbf{a} = a + \epsilon_1 a' + \epsilon_2 \dot{a} + \epsilon_3 \dot{a}'$, entonces

$$f(\mathbf{a}) = f(a) + \epsilon_1 a' \dot{f}(a) + \epsilon_2 \dot{a} \dot{f}(a) + \epsilon_3 (a'\dot{a}\ddot{f}(a) + \dot{a}'\dot{f}(a)). \tag{5.5}$$

Usando la regla de la cadena se obtiene

$$f(\mathbf{a}) = b + \epsilon_1 b' + \epsilon_2 \dot{b} + \epsilon_3 \dot{b}'.$$

Para obtener el resultado en la cuarta componente se aplica la regla de la cadena y la regla del producto para las derivadas como sigue:

$$a'\dot{a}\ddot{f}(a) + \dot{a}'\dot{f}(a) = (\dot{a}\dot{f}(a))' = \dot{f}'(a).$$

□

Para comprobar que (5.5) es una extensión de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{SA}$, basta evaluarlo en puntos de la forma $(a, 0, 0, 0)$ y para ver que es una extensión de $\mathbb{A}$ a $\mathbb{SA}$, sólo es necesario evaluarlo en puntos de la forma $(a, a', 0, 0)$.

Análogo al espacio Adouble, se puede definir una función de n variables superadoubles de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} f(x_1, \ldots, x_n) = & \; f(a_{11}, \ldots, a_{1n}) \\ & + \epsilon_1(a_{21} f'_{x_1}(a_{11}, \ldots, a_{1n}) + \cdots + a_{2n} f'_{x_n}(a_{11}, \ldots, a_{1n})) \\ & + \epsilon_2(b_{11} f'_{x_1}(a_{11}, \ldots, a_{1n}) + \cdots + b_{1n} f'_{x_n}(a_{11}, \ldots, a_{1n})) \\ & + \epsilon_3(a_{21} b_{11} f''_{x_1}(a_{11}, \ldots, a_{1n}) + \cdots + a_{2n} b_{1n} f''_{x_n}(a_{11}, \ldots, a_{1n}) \\ & + b_{21} f'_{x_1}(a_{11}, \ldots, a_{1n}) + \cdots + b_{2n} f'_{x_n}(a_{11}, \ldots, a_{1n})), \end{aligned}$$

donde $x_i = (a_{1i}, a_{2i}, b_{1i}, b_{2i})$ para todo $i = 1, \ldots, n$.

Todo lo desarrollado en esta sección para funciones de una variable superadouble se cumple para estas funciones en varias variables.

En este capítulo se demostró que la metodología presentada en el Capítulo 3 es una herramienta válida para calcular derivadas anidadas.

Conclusiones

Con la metodología propuesta en este trabajo es posible utilizar la diferenciación automática para calcular derivadas anidadas. Esta metodología es sencilla de implementar gracias a que se puede reusar otras librerías de AD que soporten sobrecarga de operadores. Además, se hizo un estudio algebraico de las propiedades de los números que sustentan tanto la diferenciación automática como la diferenciación automática anidada.

Como recomendaciones y trabajo futuro se propone implementar el modo hacia atrás de la diferenciación automática con los números de tipo Super-Adouble, lo cual sería útil en los casos que la función anidada con dominio en $\mathbb{R}^n$ e imagen en $\mathbb{R}$, y generalizar los resultados obtenidos para el caso en que haya más de un nivel de anidación.

Bibliografía

[1] David G. Luenberger. *Linear and nonlinear programming*, 1984. Addison-Wesley.

[2] Hairer, Wanner. *Solving Ordinary Differential Equations. Vol II: Stiff and Differential Algebraic Problems*, 1991. Springer Verlag.

[3] A. Griewank, A. Walther. *Evaluating Derivatives. Principles and Techniques of Algorithmic Differentiation*, 2008. SIAM.

[4] Andrea Walther.*Getting Started with ADOL-C*, 2009.

[5] Barak A. Pearlmutter, Jeffrey Mark Siskind. *Using Programming Language Theory to Make Automatic Differentiation Sound and Efficient.*

[6] Manuel Alfredo Ferreiro. *ADOLNet, Herramienta para la Diferenciación Automática en .NET.*, 2010. Facultad de Matemática y Computación, Universidad de La Habana.

[7] Jan Riehme, Andreas Griewank. *Algorithmic Differentiation Through Automatic Graph Elimination Ordering*, 2009.

[8] Jeffrey Mark Siskind, Barak A. Pearlmutter. *Putting the Automatic Back into AD: Part I, What's Wrong*, 2008.

[9] Andreas Griewank. *A mathematical view of automatic differentiation*, 2003. Cambridge University Press.

[10] Harry H. Cheng. *Programming with Dual Numbers and its Applications in Mechanisms Desing*, 1994. Engineering with Computers, Vol. 10, No.4, pp. 212-229.

[11] Michel Queysanne. *Álgebra Básica*, 1973. Editorial Vicens-Vives.

[12] Michiel Hazewinkel, Nadiya Gubareni, Nadezhda Gubareni, Vladimir V. Kirichenko, *Algebras, rings and modules, Volume 1*, 2004. Springer.

[13] Sam A. Abolrous. *Learn C#*, 2008. Wordware Publishing.

Anexos

En este anexo se incluyen las demostraciones de las proposiciones 5.1 y 5.2.

Proposición 5.1. $\mathbb{SA}$ *es un anillo conmutativo y unitario. El neutro con respecto a la suma es el elemento* $\mathbf{0} = ((0,0),(0,0))$ *y el neutro respecto al producto es* $\mathbf{1} = ((1,0),(0,0))$.

Demostración. Sea $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbb{SA}$ con

$$\mathbf{a} = (\hat{a}_1, \hat{a}_2), \quad \hat{a}_1, \hat{a}_2 \in \mathbb{A},$$

$$\mathbf{b} = (\hat{b}_1, \hat{b}_2), \quad \hat{b}_1, \hat{b}_2 \in \mathbb{A},$$

$$\mathbf{c} = (\hat{c}_1, \hat{c}_2), \quad \hat{c}_1, \hat{c}_2 \in \mathbb{A}.$$

Según la Definición 1.3 lo primero a demostrar es que $\mathbb{SA}$ para la suma es un grupo abeliano

Sumando las expresiones

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = (\hat{a}_1 + \hat{b}_1, \hat{a}_2 + \hat{b}_2) + \mathbf{c} = (\hat{a}_1 + \hat{b}_1 + \hat{c}_1, \hat{a}_2 + \hat{b}_2 + \hat{c}_2),$$

$$\mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} + (\hat{b}_1 + \hat{c}_1, \hat{b}_2 + \hat{c}_2) = (\hat{a}_1 + \hat{b}_1 + \hat{c}_1, \hat{a}_2 + \hat{b}_2 + \hat{c}_2),$$

se obtiene que

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}).$$

La suma es conmutativa:

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (\hat{a}_1 + \hat{b}_1, \hat{a}_2 + \hat{b}_2) = (\hat{b}_1 + \hat{a}_1, \hat{b}_2 + \hat{a}_2) = \mathbf{b} + \mathbf{a}.$$

El $\mathbf{0}$ es elemento neutro para la suma:

$$\mathbf{a} + \mathbf{0} = (\hat{a}_1, \hat{a}_2) + ((0,0),(0,0)) = (\hat{a}_1, \hat{a}_2) = \mathbf{a}.$$

Todo elemento tiene opuesto para la suma: Sea $\mathbf{a}' = (-\hat{a}_1, -\hat{a}_2)$, entonces

$$\mathbf{a} + \mathbf{a}' = (\hat{a}_1, \hat{a}_2) + (-\hat{a}_1, -\hat{a}_2) = \mathbf{0}.$$

Multiplicando las expresiones

$$(\mathbf{ab})\mathbf{c} = (\hat{a}_1\hat{b}_1, \hat{a}_1\hat{b}_2 + \hat{a}_2\hat{b}_1)(\hat{c}_1, \hat{c}_2) = (\hat{a}_1\hat{b}_1\hat{c}_1, \hat{a}_1\hat{b}_1\hat{c}_2 + \hat{a}_1\hat{b}_2\hat{c}_1 + \hat{a}_2\hat{b}_1\hat{c}_1),$$

$$\mathbf{a}(\mathbf{bc}) = (\hat{a}_1, \hat{a}_2)(\hat{b}_1\hat{c}_1, \hat{b}_1\hat{c}_2 + \hat{b}_2\hat{c}_1) = (\hat{a}_1\hat{b}_1\hat{c}_1, \hat{a}_1\hat{b}_1\hat{c}_2 + \hat{a}_1\hat{b}_2\hat{c}_1 + \hat{a}_2\hat{b}_1\hat{c}_1),$$

se obtiene que

$$(\mathbf{ab})\mathbf{c} = \mathbf{a}(\mathbf{bc}).$$

El producto es conmutativo:

$$\mathbf{ab} = (\hat{a}_1, \hat{a}_2)(\hat{b}_1, \hat{b}_2) = (\hat{a}_1\hat{b}_1, \hat{a}_1\hat{b}_2 + \hat{a}_2\hat{b}_1) = (\hat{b}_1\hat{a}_1, \hat{b}_1\hat{a}_2 + \hat{b}_2\hat{a}_1) = \mathbf{ba}.$$

Multiplicando las siguiente expresiones

$$\mathbf{a}(\mathbf{b}+\mathbf{c}) = (\hat{a}_1, \hat{a}_2)(\hat{b}_1 + \hat{c}_1, \hat{b}_2 + \hat{c}_2) = (\hat{a}_1\hat{b}_1 + \hat{a}_1\hat{c}_1, \hat{a}_1\hat{b}_2 + \hat{a}_1\hat{b}_2 + \hat{a}_2\hat{b}_1 + \hat{a}_2\hat{c}_1),$$

$$\mathbf{ab}+\mathbf{ac} = (\hat{a}_1\hat{b}_1, \hat{a}_1\hat{b}_2+\hat{a}_2\hat{b}_1)+(\hat{a}_1\hat{c}_1, \hat{a}_1\hat{c}_2+\hat{a}_2\hat{c}_1) = (\hat{a}_1\hat{b}_1+\hat{a}_1\hat{c}_1, \hat{a}_1\hat{b}_2+\hat{a}_1\hat{b}_2+\hat{a}_2\hat{b}_1+\hat{a}_2\hat{c}_1),$$

se obtiene que

$$\mathbf{a}(\mathbf{b}+\mathbf{c}) = \mathbf{ab} + \mathbf{ac}.$$

El $\mathbf{1}$ es elemento neutro con respecto al producto:

$$\mathbf{a1} = (\hat{a}_1, \hat{a}_2)((1,0),(0,0)) = (\hat{a}_1, \hat{a}_2) = \mathbf{a}.$$

□

Proposición 5.2. *El espacio $\mathbb{SA}_{\mathbb{R}}$ es un anillo conmutativo.*

Demostración. Sea $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbb{SA}_{\mathbb{R}}$ con

$$\mathbf{a} = (a_1, \dot{a}_1, a_2, \dot{a}_2), \quad a_1, \dot{a}_1, a_2, \dot{a}_2 \in \mathbb{R},$$

$$\mathbf{b} = (b_1, \dot{b}_1, b_2, \dot{b}_2), \quad b_1, \dot{b}_1, b_2, \dot{b}_2 \in \mathbb{R},$$

$$\mathbf{c} = (c_1, \dot{c}_1, c_2, \dot{c}_2), \quad c_1, \dot{c}_1, a_2, \dot{c}_2 \in \mathbb{R},$$

Este espacio con la suma es un grupo abeliano porque coincide con la suma usual de $\mathbb{R}^4$ como grupo.

Multiplicando las siguiente expresiones

$$\mathbf{ab} = (a_1b_1, a_1\dot{b}_1 + \dot{a}_1b_1, a_1b_2 + a_2b_1, a_1\dot{b}_2 + \dot{a}_1b_2 + a_2\dot{b}_1 + \dot{a}_2b_1),$$

$$\begin{aligned}(\mathbf{ab})\mathbf{c} = (&a_1b_1c_1, a_1b_1\dot{c}_1 + a_1\dot{b}_1c_1 + \dot{a}_1b_1c_1, a_1b_1c_2 + a_1b_2c_1 + a_2b_1c_1,\\ &a_1b_1\dot{c}_2 + a_1\dot{b}_1c_2 + \dot{a}_1b_1c_2 + a_1\dot{b}_2c_1 + \dot{a}_1b_2c_1 + a_2\dot{b}_1c_1 + \dot{a}_2b_1c_1),\end{aligned}$$

$$\mathbf{bc} = (b_1c_1, b_1\dot{c}_1 + \dot{b}_1c_1, b_1c_2 + b_2c_1, b_1\dot{c}_2 + \dot{b}_1c_2 + b_2\dot{c}_1 + \dot{b}_2c_1),$$

$$\begin{aligned}\mathbf{a}(\mathbf{bc}) = (&a_1b_1c_1, a_1b_1\dot{c}_1 + a_1\dot{b}_1c_1 + \dot{a}_1b_1c_1, a_1b_1c_2 + a_1b_2c_1 + a_2b_1c_1,\\ &a_1b_1\dot{c}_2 + a_1\dot{b}_1c_2 + \dot{a}_1b_1c_2 + a_1\dot{b}_2c_1 + \dot{a}_1b_2c_1 + a_2\dot{b}_1c_1 + \dot{a}_2b_1c_1),\end{aligned}$$

se obtiene que

$$(\mathbf{ab})\mathbf{c} = \mathbf{a}(\mathbf{bc}).$$

La conmutatividad del producto se obtiene directo de la conmutatividad de la suma y la multiplicación de los números reales.

Multiplicando las expresiones

$$\mathbf{b} + \mathbf{c} = (b_1 + c_1, \dot{b}_1 + \dot{c}_1, b_2 + c_2, \dot{b}_2 + \dot{c}_2),$$

$$\begin{aligned}\mathbf{a}(\mathbf{b} + \mathbf{c}) = (&a_1b_1 + a_1c_1, a_1\dot{b}_1 + a_1\dot{c}_1 + \dot{a}_1b_1 + \dot{a}c_1, a_1b_2 + a_1c_2 + a_2b_1 + a_2c_1,\\ &a_1\dot{b}_2 + a_1\dot{c}_2 + \dot{a}_1b_2 + \dot{a}_1c_2, a_2\dot{b}_1 + a_2\dot{c}_1 + \dot{a}_2b_1 + \dot{a}_2c_1),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{ab} &= (a_1b_1, a_1\dot{b}_1 + \dot{a}_1b_1, a_1b_2 + a_2b_1, a_1\dot{b}_2 + \dot{a}_1b_2 + a_2\dot{b}_1 + \dot{a}_2b_1),\\ \mathbf{ac} &= (a_1c_1, a_1\dot{c}_1 + \dot{a}_1c_1, a_1c_2 + a_2c_1, a_1\dot{c}_2 + \dot{a}_1c_2 + a_2\dot{c}_1 + \dot{a}_2c_1),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{ab} + \mathbf{ac} = (&a_1b_1 + a_1c_1, a_1\dot{b}_1 + a_1\dot{c}_1 + \dot{a}_1b_1 + \dot{a}c_1, a_1b_2 + a_1c_2 + a_2b_1 + a_2c_1,\\ &a_1\dot{b}_2 + a_1\dot{c}_2 + \dot{a}_1b_2 + \dot{a}_1c_2, a_2\dot{b}_1 + a_2\dot{c}_1 + \dot{a}_2b_1 + \dot{a}_2c_1),\end{aligned}$$

se obtiene que

$$\mathbf{a}(\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{ab} + \mathbf{ac}$$

□